

Impfplan für Rassegeflügel

Alter	Impfstoff	Dosierung	Chargen-Bez.		Erledigt am
1. Tag	Marek´sche Krankheit	02 ml pro Tier per Injektion		!	
5.-9. Tag	Paracox 8 (Kokzidiose)	0,1 ml + 5 ml Wasser pro Tier		!!	
14. Tag	1. ND (Hitchner, HB-1)	5 Liter pro 1000 Tiere		!!!	
21. Tag	Gumboro	7 Liter pro 1000 Tiere		!!	
28. Tag	Infektiöse Bronchitis (IB1)	10 Liter pro 1000 Tiere		!	
35. Tag	2. ND (LaSota)	13 Liter pro 1000 Tiere		!!!	
7.-10. Woche	ILT Pocken Coryza	Augentropfen wing web per Inj. 0,5 ml		!! ! !	
12. Woche	IB 2	24 Liter pro 1000 Tiere		!	
14. Woche	3. ND (LaSota)	26 Liter pro 1000 Tiere		!!!	

Gegen Newcastle Disease (ND) ist alle 3 Monate nachzuimpfen (mit LaSota oder Hitchner HB-1), um die Tiere ausreichend zu schützen.

!!! gesetzlich vorgeschrieben

!! von unserer Praxis unbedingt empfohlene Impfung

! weitere sinnvolle Impfungen insbesondere bei entsprechenden Problemen

Bei Problemen mit IB ist eine Impfung gegen IB alle 3 Monate zu empfehlen.

Zwischen IB und ND Impfungen sollte mind. Eine Woche liegen.

Zwischen ILT und ND oder IB sollten mind. Zwei Wochen liegen.